

Rozwiązania żywieniowe Nestlé Nutrition

Od 1. dnia życia do dokarmiania i karmienia wyłącznego dla dzieci zdrowych

NAN® OPTipro® PLUS

5 HMO®
białko
OPTIPRO®



DENMUP210/1ZENMUP209-1/NANMPE261

Po porodzie naturalnym i przez cesarskie cięcie

NAN® SUPREMEpro

6 HMO®
GENTLE
OPTIPRO®
SINERGY™



DENWHF2163/DENWHF2088

Po porodzie naturalnym i przez cesarskie cięcie

NAN® OPTipro®

białko
OPTIPRO®
B. lactis



NMB27-3

Mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia

NAN® EXPERTpro HA

Częściowo
hydrolizowane
białko
serwatkowe



DENWH130/DENWH5300

Do stosowania w profilaktyce AZS¹

Nestlé
Baby & me
Medical



Zeskanuj kod QR,
aby dowiedzieć się
więcej na temat
produktów

1. Gappa M. et al. Allergy. 2021; 76 (6): 1903–1907.

Rozwiązania żywieniowe Nestlé Nutrition, dopasowane do specjalnych potrzeb

NAN® EXPERTpro

Od urodzenia

BEZ
LAKTOZY



NLW0533

Przy konieczności wyeliminowania laktozy

NAN® EXPERTpro TOTAL COMFORT

Od urodzenia

L. reuteri
białko
OPTIPRO® HA
GOS/FOS
magnez

KOLKA
ZAPARCIE
ULEWANIE



DENW5P6B20

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego

NAN® EXPERTpro AR

Od urodzenia

L. reuteri
skrobia i karob
białko
OPTIPRO®

ULEWANIE



FRW55324

PreNAN® HMF

Wzmacniacz
mleka kobiecego
dla wcześniaków
oraz niemowląt
o małej masie
urodzeniowej



DS4001

Preparat wzbogacający mleko kobiece

PreNAN®

Dla wcześniaków
i niemowląt
o małej i bardzo
małej masie
urodzeniowej



DEW4408 / DS4B290-1

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego

WAŻNA INFORMACJA. Gdy niemowlę przyjdzie na świat, najlepszym dla niego sposobem żywienia jest karmienie piersią. W pełni popieramy zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące wyłącznego karmienia piersią przez pierwsze sześć miesięcy życia dziecka. Po tym okresie należy rozpocząć wprowadzanie żywności uzupełniającej o odpowiedniej wartości odżywczej przy jednoczesnej kontynuacji karmienia piersią do ukończenia przez dziecko 2 lat. Zdajemy sobie też sprawę z tego, że nie każde dziecko może być karmione mlekiem maty. Jeśli rodzice decydują, że niemowlę nie będzie karmione piersią, specjaliści ochrony zdrowia powinni poinformować ich, że taka decyzja może być trudna do odwrócenia, a rozpoczęcie częściowego dokarmiania butelką spowoduje zmniejszenie ilości wytwarzanego mleka. Rodzice powinni wziąć pod uwagę także społeczne i finansowe konsekwencje rezygnacji z karmienia piersią. Aby uniknąć ryzyka dla zdrowia ważne jest, by żywność dla dziecka przygotowywać, stosować i przechowywać zawsze zgodnie z informacją na opakowaniu.